

MIBGの集積影響薬剤について<心臓>

薬効分類	薬剤名（一般名）	休薬期間目安 （5半減期）	備考
α β 遮断薬	ラベタロール	85時間（約4日）	その他のアドレナリン受容体作動薬は控える必要なし
三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	155時間（約7日）	添付文書に記載あり
	アモキサピン	40時間（約2日）	
	イミプラミン	103時間（約5日）	
	クロミプラミン	105時間（約5日）	
	ドスレピン	55.5時間（約2.3日）	
	ノルトリプチリン	133.5時間（約6日）	
四環系抗うつ薬	ミアンセリン	90時間（約4日）	
SNRI製剤	ミルナシプラン	40時間（約2日）	
	デュロキセチン	75時間（約3日）	
	ベンラファキシン	60時間（約3日）	
SSRI製剤	フルボキサミン	85時間（約4日）	
NE枯渴薬	レセルピン	不明	ASNC・ESNMガイドラインでは14日
精神安定剤	ハロペリドール	412時間（約18日）	
強心配糖体	ジゴキシン	121時間（約5日）	
交感神経作用薬	エフェドリン塩酸塩	34時間（約2日）	
	フェニレフリン塩酸塩	不明	ASNC・ESNMガイドラインでは7～14日
コカイン系製剤	コカイン塩酸塩	不明	ASNC・ESNMガイドラインでは7～14日
抗パーキンソン病薬	セレギリン	8時間	
	ドロキシドパ	7.5時間	12時間でほぼ消失
	レボドパ	7時間	

MIBGの集積影響薬剤について<腫瘍>

薬効分類	薬剤名（一般名）	休薬期間目安 （5半減期）	備考
α β 遮断薬	ラベタロール	85時間（約4日）	その他のアドレナリン受容体作動薬は控える必要なし
三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	155時間（約7日）	添付文書に記載あり
	アモキサピン	40時間（約2日）	
	イミプラミン	103時間（約5日）	
	クロミプラミン	105時間（約5日）	
	ドスレピン	55.5時間（約2.3日）	
	ノルトリプチリン	133.5時間（約6日）	
四環系抗うつ薬	ミルタザピン	90時間（約4日）	
SNRI製剤	ミルナシプラン	40時間（約2日）	
	デュロキセチン	75時間（約3日）	
SSRI製剤	フルボキサミン	85時間（約4日）	
NE枯渴薬	レセルピン	不明	ASNC・ESNMガイドラインでは14日
ジヒドロピリジン系	アムロジピン	200時間（約9日）	
	ニフェジピン	25時間（約1日）	
	シルニジピン	27.5時間（約1日）	
ベンゾジアゼピン系	ジルチアゼム	22.5時間（約1日）	
フェニルアルキルアミン系	ベラパミル	9時間	